

Alivie as Cólicas e Viva Melhor

Nada mais incômodo do que ser obrigado a cancelar um compromisso importante por causa de uma cólica. Mas o dia-a-dia de muitas pessoas é frequentemente interrompido pelas cólicas, dores e desconforto abdominal.

Esses males ocorrem tanto nos homens quanto nas mulheres e as razões mais comuns* são: má alimentação, pedras na vesícula ou rins, menstruação e até mesmo situações de estresse. Uma pesquisa* encomendada pelo laboratório Boehringer Ingelheim, fabricante do **Buscopan®**, revelou que as mulheres apresentam 16,2 ocorrências de cólicas durante um ano e os homens só um pouco menos: 13,7. Isso significa mais de um dia de cólica por mês! Para se ter uma idéia da extensão do problema, cerca de 25% da população mundial**, entre homens e mulheres, sofrem de algum tipo de cólica, dor ou desconforto na região abdominal.

É comum as pessoas tentarem solucionar esses males tomando analgésicos – mas eles não são a alternativa mais indicada, já que apenas aliviam a dor, sem agir diretamente na sua origem. Neste caso, o melhor é tratar com **Buscopan®** que atua diretamente na região gastrointestinal, regularizando o movimento dos órgãos e relaxando a musculatura lisa da região abdominal, o que proporciona alívio rápido e prolongado. O medicamento está com nova embalagem e pode ser encontrado em gotas, drágeas e comprimidos, em duas versões: **Buscopan®**, com ação antiespasmódica (efeito antiespasmos); e **Buscopan® Plus**, com dupla-ação: antiespasmódica e analgésica (alívio da dor).

Não deixe a cólica atrapalhar o seu dia. Tenha Buscopan sempre por perto.

Alivie as cólicas e viva melhor!

* Fonte: Pesquisa Omnibus - abril 2002

**Fonte: Tygat GNJ, Paulo LG, Mueller-Lissner S, et al. The community prevalence of abdominal pain and cramps: A multi-national survey. Digestive Disease Week. 2006 Poster



É rápido. É eficaz. É Buscopan®

SAC: 0800 701 6633

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Buscopan®: Contra-indicações - Hipersensibilidade conhecida ao butilbrometo de escopolamina ou a qualquer outro componente da fórmula de BUSCOPAN®. Diarréia aguda ou persistente da criança. Pacientes portadores de miastenia grave, megacólon, glaucoma de ângulo fechado, hipertrofia prostática, íleo-paralítico e estenose pilórica. MS: 1.0367.0014. **Buscopan® Plus**: É contra-indicado em caso de miastenia grave e de megacólon. Não deve ser administrado em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao butilbrometo de escopolamina e ou ao paracetamol. MS: 1.0367.0096

Buscopan®
butilbrometo de escopolamina